

定期の予防接種(予防接種法により、対象者、接種間隔などが定められています。)

接種の計画を立てる際にわからないときには、かかりつけ医、保健師等にご相談ください。

標準的な接種期間 予防接種法で定められている接種年齢 ↓ 接種の目安 R8.4月現在

ワクチンの種類		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	接種回数・接種間隔
種類	区分													
ロタウイルス	経口生ワクチン	※	※	※は、1回目接種の標準的な接種期間です。										27日以上の間隔において2回接種 ※1回目は生後14週6日までに受けましょう。
	ロタテック(5価)	※	※	※は、1回目接種の標準的な接種期間です。										27日以上の間隔において3回接種 ※1回目は生後14週6日までに受けましょう。
五種混合 [ヒブ ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ]	不活化ワクチン													(初回)20日以上、標準的には56日までの間隔において3回接種 (追加)初回接種終了後6か月以上、標準的18月に至るまでの間に1回接種
小児用肺炎球菌	不活化ワクチン													(初回)標準的には1歳までに27日以上の間隔において3回接種 ※生後2~7か月に至るまでの間に接種を開始しましょう。 (追加)生後12~15か月を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12か月に至った日以降において1回接種 ※初回接種開始時の月齢により異なります。
B型肝炎	不活化ワクチン													27日以上の間隔において2回接種 1回目から139日以上の間隔において1回接種
BCG(結核)	生ワクチン													1回接種 ※5~8か月に至るまでの間
麻しん 風しん 注1	生ワクチン													(1期)1回接種 (2期)1回接種 小学校就学前の1年間(4/1~3/31)
水痘	生ワクチン													(初回)標準的には生後12~15か月までに1回接種 (追加)初回接種終了後3か月以上、標準的には6か月以上1年の間隔において1回接種
日本脳炎	不活化ワクチン													(I期初回)6日以上、標準的には28日までの間隔において2回接種 (I期追加)初回接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔において1回接種

注1 麻しんまたは風しんにかかったお子さんは、混合ワクチンもしくは、かかっていない方の単抗原ワクチンの接種を選択できます。

予防接種実施医療機関

安達管内の予防接種実施医療機関(定期の予防接種) ※予防接種を受ける際は、事前に医療機関への予約が必要です。

医療機関名	所在地	電話番号
(医)かさい小児科クリニック	油井	22-8800
佐久間内科小児科医院	本町	22-0570
さくらクリニック	藤之前	62-3931
しんいち内科	油井	24-8420
(医)実生会 土川産婦人科医院	松岡	22-0035
土川内科小児科	槻木	22-6688
(医)博愛会 東和クリニック	針道	66-2122
二本松ウイメンズクリニック	亀谷	24-1322
二本松市岩代国保診療所	百目木	56-2461
(医)辰星会 研病院	本町	22-2828
(医)三浦内科医院	亀谷	23-3883
みうら内科クリニック	羽石	22-5512
(医)慈水会 みずのクリニック	根崎	23-5158
和田医院	小浜	55-2303
渡辺医院	正法寺町	62-3000
いしわたクリニック	荒井	63-2826
(医)上遠野内科医院	荒町	33-5866
(医)慈久会 谷病院	南町裡	33-2721
マインドさくらクリニック	万世	24-7277
(医)よしだこどもクリニック	高木	34-6418
よしだ内科	一ツ屋	63-2333
(医)渡辺クリニック	高木	34-3311